

# L'OISEAU SUR LA BRANCHE

## BECASSEAU SANDERLING

Tiri, Tuki (Marquises)


*Calidris alba*

Sanderling


### Aspect et couleur

Mâle et femelle ont la même apparence. Ce petit oiseau mesure 20 cm de long. Lorsque cette espèce hiverne sous nos latitudes, elle présente une livrée blanche à gris-beige, les plumes du dos et de la queue sont bordées de blanc. La calotte et le dos sont en général gris sombre. Les pattes et le bec sont noirs.

Son plumage reproducteur est entièrement brun moucheté de sombre à l'exception du ventre qui reste blanc. Les plumes du dos et des ailes sont margées de blanc.



### Répartition



Cet oiseau se reproduit dans les régions arctiques de juin à août (été boréal). Il vient hiverner, entre autre, dans le Pacifique tropical du mois de septembre à mai (été austral).

Il se rencontre sur l'ensemble des archipels de la Polynésie française où il reste toutefois rarement observé (Scilly, Maupiti, Huahine, Tahiti, Maria, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Tikehau, Reao, Tureia, Vahanga, Maturei Vavao, Gambier, Nuku Hiva, Ua Pou).

Cet oiseau, non menacé, est classé « préoccupation mineure » (LC) par l'UICN.

### Habitat et nourriture

Sur ses zones d'hivernage, cet oiseau limicole fréquente les bordures côtières. Il a un comportement caractéristique : il court le long de la plage sur la zone de déferlement de la vague lorsque celle-ci se retire.

Il y picore de petits mollusques et crustacés. Il se nourrit aussi d'insectes (larves ou adultes). Au nord du Cercle Arctique, Il fréquente plus l'intérieur des terres.



### Comportement et reproduction

Le bécasseau sanderling se reproduit uniquement dans les régions arctiques. Il niche dans une petite dépression du sol. La femelle pond 3 à 4 œufs que le couple couve à tour de rôle. L'incubation dure entre 24 et 27 jours. Les jeunes prennent leur envol après 17 jours d'élevage environ.

Sur les sites d'hivernage le bécasseau sanderling est un oiseau solitaire.