

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

CANARD A SOURCIL


Mo'ora, Mo'ora oviri (Société, Australes), Mokora (Rapa)

Anas poecilorhyncha Forster

Gray Duck

Aspect et Couleur

Taille environ 25 cm.
oiseau de couleur brune
dessus de la tête foncé
l'oeil est réhaussé d'un "sourcil"
bien marqué
bec typique gris bleuté



Répartition et abondance

Espèce autrefois décrite comme abondante qui a souffert de la chasse et de raréfaction des zones humides par drainage.

Canard largement répandu dans le Pacifique.

En Polynésie française il est présent aux îles de la Société (Tahiti, Moorea, Maiao, Raiatea et Tahaa, avant 1970 à Bora Bora et Huahine) et aux îles Australes (Tubuai, Rapa et avant 1970 à Rimatara et Raivavae). Observé sur l'île de Niau aux Tuamotu en 1974.

Habitat

Les oiseaux fréquentent les lacs, les mares, les marais, les lagunes, les bords de rivières, les tarodières et les baies pour se nourrir.

Comportement

La chasse les a rendu plutôt farouches et les mouvements ont lieu de préférence le matin et le soir et suivent souvent le rythme des marées qui découvrent les vasières. Ces oiseaux assez grégaires se déplacent en couples ou en groupes pouvant atteindre jusqu'à 100 individus.

Vol battu direct cou tendu et très facilement reconnaissable

Nourriture

Les oiseaux se nourrissent en eau peu profonde, sur des vasières et des prairies humides.

Reproduction

Elle est également mal connue : on sait cependant que le nid est construit au sol dans la végétation herbacée avec des fragments végétaux (fougère) et des plumes.

Les pontes connues comptaient de 6 à 9 oeufs de couleur chamois chair de 53 sur 38 mm.