

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

COUCOU DE NOUVELLE-ZELANDE

'AREVAREVA (Tahiti)
KAREVAREVA (Marquises)
KUREVAREVA (Tuamotu)
KO'E KO'E (Rapa)


Long-tailed cuckoo

Urodynamis taitensis (Sparrman)

Taille 40 cm

Couleur

Oiseau brun sur le dessus et beige clair dessous.
Son plumage bringé le rend très mimétique.



Répartition

Migre pour passer l'hiver austral en Mélanésie, Micronésie et Polynésie.

Observé dans tous les archipels de Polynésie, mais rare aux îles Marquises.

Présent toute l'année mais plus fréquent de mars à août.

La majorité des oiseaux collectés en Polynésie orientale sont des mâles.

Habitat

Fréquente les habitats boisés tant sur les îles hautes que sur les atolls

On le rencontre dans les forêts indigènes jusqu'à plus de 600m d'altitude, les forêts secondaires, les cocoteraies et les jardins.

Plus commun sur les atolls et les petites îles que sur les grandes îles volcaniques où il fréquente plutôt les jardins et plantations de la zone littorale.

Allure en vol

Typique et reconnaissable à cause de sa longue queue.

Il parcourt plus de 7000 km au dessus de l'océan Pacifique pour parvenir sur nos îles.

Chant

Sifflement fort et long, assez aigu, isolé : " chuiit, ouiit ". Parfois terminé par une trille.

Ce sifflement caractéristique est souvent entendu avant une averse, d'où le nom aussi donné au 'arevareva d'oiseau de pluie.

Nourriture

Se nourrit de grosses chenilles, d'insectes (coléoptères, libellules, hemiptères et lépidoptères) et parfois de lézards.

Reproduction

Niche en Nouvelle-Zélande.